

RIFLETTORI PUNTATI SUL SUCCESSO DEGLI STAKEHOLDER

Rilevazione precoce della malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica mediante FIB-4

 PAZIENTE	AUMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA	Il 14,5% dei pazienti sottoposti a screening (5.662 su 39.020) con FIB-4 è stato recentemente identificato come a rischio da moderato ad alto per lo sviluppo futuro di malattia epatica.
	AUMENTO DEL BENESSERE	Il 64,7% dei pazienti con rischio da moderato ad alto è stato sottoposto a follow-up ogni 6 mesi (14,7%) o ogni anno (50%). I pazienti hanno riferito un miglioramento dell'esperienza, una minore durata della degenza ospedaliera e una riduzione dell'assenteismo durante i giorni lavorativi.
 MEDICO	AUMENTO DELLA FIDUCIA	Da un'indagine clinica condotta tra i medici di base (180 intervistati su 600) emergono risultati che indicano livelli elevati di fiducia in FIB-4 per il processo decisionale clinico relativo alla gestione della malattia epatica: <ul style="list-style-type: none">• Il 64% dei medici intervistati trova che FIB-4 è accurato nell'escludere la fibrosi avanzata.• Il 74% dei medici intervistati indica che FIB-4 aiuta a escludere la fibrosi avanzata, specialmente in contesti con risorse limitate.• Il 71% dei medici intervistati indica che FIB-4 è il metodo preferito per il monitoraggio dello stato della malattia epatica.
 SISTEMA SANITARIO/AMMINISTRAZIONE	AUMENTO DELL'AFFLUENZA	Le visite ai pazienti con l'utilizzo di FIB-4 sono aumentate di 2,9 volte, da 50.257 (luglio-dicembre 2022) a 145.697 (gennaio-settembre 2023), indicando un aumento sostanziale dell'utilizzo di FIB-4 ed evidenziando la sua crescente importanza nelle pratiche sanitarie.
 FINANZIATORE	RIDUZIONE DEI COSTI SANITARI	Riduzione dei costi annuali per RM 9,3 milioni sulla base dei costi diretti associati allo screening (FibroScan vs. FIB-4) per i pazienti a rischio da moderato ad alto. Non sono inclusi i costi a livello di paziente associati alle spese di viaggio a causa della limitata disponibilità di FibroScan.